Hygieneplan Arztpraxis

Vorlage zum Ausfüllen · anzupassen an die eigene Praxis und die verwendeten Produkte

Einrichtung		**Erstellt am**	
Anschrift		**Version**	
Verantwortlich		**Nächste Prüfung**	

Was	Wann	Womit (Mittel / Konzentration)	Wie	Wer	Kürzel
HÄNDEHYGIENE					
Hygienische Händedesinfektion	Vor und nach jedem Patientenkontakt, nach Ablegen der Handschuhe	[Produktname] Händedesinfektion, unverdünnt	3 ml in die trockene Hand, 30 Sek. einreiben, alle Flächen benetzen	Alle	
Chirurgische Händedesinfektion	Vor invasiven Eingriffen	[Produktname], unverdünnt	Einwirkzeit nach Herstellerangabe, Hände dauerhaft feucht halten	Ärztl. Personal	
Händewaschen	Bei sichtbarer Verschmutzung, nach WC, vor Pausen	Waschlotion aus Spender	Waschen, mit Einmalhandtuch trocknen, anschließend desinfizieren	Alle	
Hautpflege	Nach der Arbeit, in Pausen	Hautpflegecreme aus Spender	Auf trockene Hände auftragen, Hautschutzplan beachten	Alle	
FLÄCHEN					
Patientenliege, Kontaktflächen	Nach jedem Patienten	[Produktname] Flächendesinfektion, [%], gebrauchsfertig	Wischdesinfektion, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit einhalten	MFA	
Behandlungsraum: Böden	Täglich nach Praxisschluss	[Produktname], [%]	Feuchtwischen, Bezug je Raum wechseln	Reinigungskraft	
Türgriffe, Lichtschalter, Tresen	Täglich, bei Bedarf öfter	[Produktname] Flächendesinfektion	Wischdesinfektion	MFA	
Wartezimmer, Stühle	Täglich	Reiniger, bei Kontamination Desinfektion	Feucht wischen	Reinigungskraft	
Kontamination mit Blut oder Sekret	Sofort	[Produktname], nicht-alkoholisch, [%]	Material mit Tuch aufnehmen, Fläche desinfizieren, Handschuhe tragen	Alle	
INSTRUMENTE UND MEDIZINPRODUKTE					
Instrumente unkritisch	Nach Gebrauch	[Produktname] Instrumentendesinfektion, [%], [ ] Min.	Vollständig eintauchen, luftblasenfrei, spülen, trocknen	MFA	

Was	Wann	Womit (Mittel / Konzentration)	Wie	Wer	Kürzel
Instrumente semikritisch A	Nach Gebrauch	Reinigung und Desinfektion nach Aufbereitungs-SOP	Reinigen, desinfizieren, prüfen, verpacken, sterilisieren	MFA (Sachkunde)	
Stethoskop, Blutdruckmanschette	Täglich, bei Kontamination sofort	Alkoholisches Desinfektionstuch	Abwischen, Einwirkzeit beachten	Alle	
SANITÄR, WÄSCHE, ABFALL					
Patienten-WC	Täglich, bei Bedarf mehrfach	Sanitärreiniger, WC-Sitz mit Desinfektionsmittel	Von rein nach unrein, separates Wischtuch	Reinigungskraft	
Spender auffüllen und prüfen	Täglich	Seife, Handtuchpapier, Desinfektionsmittel	Restmengen prüfen, Spender außen wischen	MFA	
Berufskleidung	Täglich wechseln, bei Kontamination sofort	Desinfizierende Wäsche ab 60 °C	Getrennt von Privatwäsche waschen	Alle	
Abfall Gruppe B (spitz, scharf)	Laufend	Durchstichsicherer Behälter	Nicht umfüllen, nicht recappen, bei 3/4 Füllung verschließen	Alle	

Hinweise zur Anwendung

— Diese Vorlage ersetzt keinen individuellen Hygieneplan. Rechtsgrundlage sind das Infektionsschutzgesetz, die Biostoffverordnung, die TRBA 250 sowie die Empfehlungen der KRINKO beim Robert Koch-Institut.

— Alle Platzhalter in eckigen Klammern durch die tatsächlich eingesetzten Produkte, Konzentrationen und Einwirkzeiten ersetzen. Maßgeblich sind immer die Angaben des Herstellers auf dem Etikett.

— Nur Desinfektionsmittel mit nachgewiesener Wirksamkeit einsetzen, üblicherweise aus der VAH-Liste. Für behördlich angeordnete Entseuchungen gilt die RKI-Liste.

— Den Plan an gut sichtbarer Stelle aushängen, mindestens jährlich prüfen und die Unterweisung des Personals dokumentieren.